A REVOLUÇÃO NA HORTICULTURA

MIRAC® HF

A Revolução no HortiFruti

qbn TECNOLOGIA

INOVAÇÕES PARA UM MUNDO MELHOR

Adubo Foliar com Nanotecnologia

Itapeva - SP

Benefícios na Cultura de Alface

1. Sua ação promove o aumento na largura das folhas. Há uma melhora significativa do produto.
2. Comparando as alfaces adubadas ou não, verifica-se um crescimento maior nas que receberam **MiracHF®**.
3. Aumenta a saúde e o tamanho da raiz.
4. Maior tempo de armazenamento (Shelf life).

	Compr. Plantas		Compr. Folhas		Larg. Folhas		Número Folhas		Peso Líquido	
	cm	%	cm	%	cm	%	cm	%	g	%
MiracHF®	12,3	**12,1**	16,0	**14,3**	16,9	**32,0**	11,4	**15,7**	**64,5**	40,6
Controle	**11,0**	-	**14,0**	-	**12,8**	-	**9,9**	-	**45,8**	-

*Resultados dos Testes realizados na Estação de Pesquisa Ambiental de Plantas da Coréia

Benefícios na cultura de Tomate

1. Maior vigor
2. Folhas mais espessas com cores vivas e brilhosas
3. Maior rendimento
4. Polpa firme
5. Maior tempo de armazenamento
6. Aumento do Brix (açúcar) com melhora no sabor do fruto.
7. Aumento do tamanho e uniformidade



Variedade: Tomate Cereja
MiracHF: Pulverizar a cada 3 semanas após o plantio

	Vigor da Planta	Cor da Folha	Frutificação	Tamanho do Fruto	Cor	Capacidade de Armazenamento	Açúcar	Resistência à pragas
MiracHF®	Forte	Verde Escuro	Excelente	20~25g	Brilhosa	Muito Boa	8,8	Forte
Controle	Médio	Verde Escuro	Boa	15~20g	Boa	Boa	8,5	Ligeiramente Forte

*Resultados dos Testes realizados na Estação de Pesquisa Ambiental de Plantas da Coréia / Diluição de MiracHF: 1/2000

Quando MiracHF® deve ser Pulverizado

Alface
Primeira pulveirização 3 dias após o replantio; após, pulverizar em intervalos de 7 dias.

Tomate / Tomate Cereja / Pepino / Beringela / Pimenta / Pimentão
Primeira pulverização 3 dias após o replantio. Após, de 7 a 10 dias da última pulverização. Após formação completa fazer manutenção da planta formada, já em produção, a cada 30 dias.

Rabanete / Batata / Batata Doce / Cenoura
Primeira pulverização de 7 a 10 dias após o plantio; segunda pulverização de 15 a 20 dias após a primeira. Após, fazer a pulverização na planta formada a cada 30 dias.

Laranja / Café / Maçã / Pera / Caqui / Pêssego / Uva
Primeira pulverização na rebrota após a poda; segunda pulverização antes da florada; terceira pulverização antes do enchimento do fruto; pulverizar entre colheitas no intervalo de 60 dias.

Flores
Pulverizar a cada 15 dias; exceto orquídeas ou flores de ciclo anual que devem ser pulverizadas 4 vezes ao ano.

Couve-flor

Hidroponia

Aplicação

1. Diluir **MiracHF®** na proporção **1 parte do produto para 2000 partes** de água limpa;
2. A **Calda** padrão é de **400L/ha (litros por hectare)**;
3. Pulverizar com **bico de nebulização** nas folhas;
4. Não deve ser pulverizado com herbicidas ou outros agroquímicos; caso ocorra **aguarde 48h** para aplicar o produto;
6. Evite o uso em períodos de vento, de orvalho e de chuva;
7. **Agite a embalagem bem antes de misturar à Água**.

Representante:

QBN Tecnologia e Comércio EIRELI-EPP
R. José Paulino, 226 - Sala 219 - Bloco B
CEP 01120-000 - São Paulo - SP
Site: **www.mirac.agr.br** / E-mail: **web@mirac.agr.br**